

ご使用に際しては、この添付文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるように大切に保管してください。

第2類医薬品

けんぶがん
健婦丸

「健婦丸」は、漢方の古書「金匱要略」に収載されている漢方処方「桂枝茯苓丸」を基本に5種の生薬末を合わせ、ハチミツを加え丸剤としたものです。

 使用上の注意

 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
 - (1) 医師の治療を受けている人。
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
 - (3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。
 - (4) 今までに薬などにより発疹・発赤、かゆみ等を起こしたことがある人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	食欲不振

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
肝機能障害	発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがあるので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

下痢
4. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

【効能・効果】

比較的体力があり、ときに下腹部痛、肩こり、頭重、めまい、のぼせて足冷えなどを訴える次の諸症:月経不順、月経異常、月経痛、更年期障害、血の道症、肩こり、めまい、頭重、打ち身(打撲症)、しもやけ、しみ

【用法・用量】

15才以上 1回30丸、1日3回、食前又は食間に服用
15才未満の小児:服用しないでください。

<用法・用量に関連する注意>
定められた用法・用量を厳守してください。
食間とは、食後2~3時間を持ちます。

【成分・分量】

本品1日量90丸中

日本薬局方 ケイヒ末	···	1,000mg
日本薬局方 ブクリヨウ末	···	1,000mg
日本薬局方 シャクヤク末	···	1,000mg
日本薬局方 ボタンピ末	···	1,000mg
日本薬局方 トウニン末	···	1,000mg

添加物としてコメデングン、ハチミツを含有する。

【保管及び取扱い上の注意】

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり、品質が変わることがあります。)
- (4) 本剤はハチミツを入れて製丸していますので、容器中で丸剤どうしがくっつくことがあります、薬効には変わりがありませんので、軽く振ってご使用ください。
- (5) 本剤は天産物を成分としていますので、製品により若干色調が異なることがあります、効果には変わりありません。
- (6) 本品には防虫・防カビのために脱酸素剤を封入しておりますが、これを食べたりしないようご注意ください。

■お客様相談窓口

株式会社 栃木天海堂 品質保証部・品質保証課
TEL 06-7711-0730
メールアドレス customer@tochimoto.co.jp
受付時間 10時~17時まで(土、日、祝日を除く)

株式会社 栃木天海堂 大阪市北区末広町3番21号

副作用被害救済制度のお問合せ先 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html> 電話 0120-149-931(フリーダイヤル)